

Aktualizovaný zoznam antidot smernice MZ SR č. RFC – 1019/94 z 1.júna 1994

Príloha č.1

Acetylcysteinum inj. - 22,5 g - 15 bal. (ACC Inject amp., 5 x 3 ml / 300 mg)
Atropini sulfas inj. - 300 mg - 30 bal. (Atropin Biotika inj., 10 x 1 ml/1 mg)
Carbo adsorbens plv.- 500 g - 20 bal. (Carbosorb plv., 1x25g)
Dimethylaminophenolum inj.- 1 250 mg -1 bal. (4 - DMAP amp., 5 x 5ml/250mg)
Flumazenilum inj.- 5 mg - 2 bal. (Flumazenil Pharmaselect amp., 5 x 5ml/0,5 mg) resp.2 bal.
Anexate amp., 5 x 5 ml/0,5mg)
Globulinum antiviperinum inj. - 2 bal. (Viper Venom Antitoxin amp.)
Glucagonum inj. - 4 mg- 4 bal. (Glucagen amp., 1 x 1 mg)
Hydroxocobalamin inj. - 5 g - 1 bal. (Cyanokit 5g, 1x250 ml/5g)
Naloxoni hydrochloridum inj.- 16 mg- 4 bal. (Naloxone amp., 10 x 1 ml/0,4 mg)
Natrii thiosulfas inj.- 25 g - 1 bal. (Natriumthiosulfat 10% amp., 25 x 10 ml/1g) resp. 1 bal.
Natriumthiosulfat 25% amp., 1x 100 ml/25g
Obidoximi chloridum inj. - 3 750 mg - 3 bal. (Toxogonin amp., 5 x 1 ml/250 mg)
Physostigmini salicylas inj.- 20 mg - 2 bal. (Anticholium amp., 5 x 5 ml / 2 mg)
Phytomenadionum inj.- 50 mg - 1 bal. (Kanavit amp., 5 x 1 ml/10 mg)
Protamin hydrochloridum inj. – 5 000 IU -1 bal. (Protamin amp., 5 x 5ml/5000 IU)
Silibinin inj.- 4 200 mg - 3 bal. (Legalon Sil amp., 4 x 350 mg)
Methylthioninium chloride inj.- 500 mg- 2 bal. (Methylthioninium chloride Proveblue amp.,
5 x 10 ml/50 mg) resp. Tolonium chlorid inj. 1 bal. (Toluidinblau amp.,5 x 10 ml/300 mg)

Zoznam antidot uvedený v prílohe č.1. by mali uchovávať všetky nemocničné lekárne v nemocniciach s poliklinikou s anestéziologicko-resuscitačným oddelením a s jednotkou intenzívnej starostlivosti.

Príloha č.2

Calcium-dinatrium-Edetat inj.- 15g - 3 bal. (Calcium Edétate de Sodium SERB inj 10x10ml/0,5g), resp. Calcium-dinatrium-Edetat inj. – 1-2 bal. (Natriumcalciumedetat inj 5x10ml/1,9g)

Deferoxamini mesilas inj. - 10 g - 2 bal. (Desferal amp., 10 x 0,5 g)

Dimerkaptopropan Na-sulfonat cps. - 2 400 mg - 8 bal. (Dimaval-DMPS cps, 3 x 100 mg)

Dantrolenum natrium trihemihydricum inj.- 480 mg - 1 bal. (Dantrium IV 1x36/20mg) – je povinný uchovávať aj Národný ústav detských chorôb v Bratislave.

Ethanol 95% sterilný - 300 ml

Nemocničné lekárne vo FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici, v Univerzitetnej nemocnici Bratislava, pracovisko akad.L. Déreza, v Univerzitetnej nemocnici L. Pasteura, Tr. SNP 1 v Košiciach a v Univerzitetnej nemocnici v Martine by mali uchovávať **antidotá uvedené v prílohe č.1. aj v prílohe č.2.**

Cyanokit 5g odporúčame zabezpečiť do zdravotníckych zariadení v lokalitách, kde sú podniky, v ktorých sa pracuje s kyanidmi, vzhľadom na nevyhnutnosť okamžitej aplikácie. Antidotum odporúčame uložiť aj do vozidiel Rýchlej zdravotnej pomoci.

Finančne náročné, zriedkavo používané a ťažko dostupné antidotá sú súčasťou pohotovostnej zásoby antidot pre celú SR, ktoré by mali byť uložené vo FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, v Univerzitetnej nemocnici Bratislava, pracovisko akad.L. Déreza, v Univerzitetnej nemocnici L. Pasteura, Tr. SNP 1 v Košiciach a v Univerzitetnej nemocnici v Martine v uvedených množstvách:

BAT, Botulism Antitoxin Heptavalent - (Equine), inj., - 3 bal. (Botulism Antitoxin Heptavalent (A, B, C, D, E, F, G), 1x 50 ml)

Digoxin imune fab inj.- 2 bal. (DigiFab TM inj., 1 x 40 mg)

Dimerkaptopropan Na-sulfonat inj. - 2 bal. (Dimaval-DMPS inj, 5 x 5ml/250 mg)

Ferriferrocyanidum cps. - 5 bal. (Antidotum Thalii cps, 30x 500mg)

Fomepizole inj. - 1 bal. (Fomepizole inj. 1,5 g/1,5 ml (1 g/ml)

